



Loterie
Nationale



UZ
LEUVEN



Kliniek Sint-Jan
Clinique Saint-Jean



VLAAMSE VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
partner voor vrouw & vrouwenarts

**Vous êtes enceinte d'une grossesse unique?
Vous avez entre 18 et 45 ans?
Vous êtes enceinte de moins de 3 mois?**

**L'étude sur le dépistage du diabète
et du diabète gestationnel pourrait
vous concerner!**



BEDIP-N

Qu'est-ce que l'étude **BEDIP-N**?

L'étude BEDIP-N évalue une nouvelle stratégie pour dépister le diabète pendant la grossesse.

Environ 135 000 femmes sont enceintes chaque année en Belgique. Cinq à dix pourcent ont un taux de sucre trop élevé pendant la grossesse. Il est très important de dépister et de traiter le diabète à temps puisque cela augmente le risque de complications pour la mère et l'enfant, aussi bien pendant qu'après la grossesse. Pour cela, un test de dépistage est recommandé pour chaque femme enceinte. On vous demandera de boire une solution sucrée et ensuite on mesurera le taux de sucre. Il y a encore beaucoup de discussion concernant l'interprétation de ce test, et quels sont les seuils de glycémie qu'il faudrait utiliser.

Dans l'étude BEDIP-N on dépistera un diabète préexistant méconnu au début de la grossesse et un nouveau diabète gestationnel. Les nouveaux seuils de glycémie seront évalués. Des données seront collectées sur le suivi prénatal, l'accouchement et comment se porte le bébé. Si un diabète ou un diabète gestationnel est dépisté, des données seront aussi collectées sur le suivi et le traitement en diabétologie, et sur le risque de présenter un diabète permanent après la grossesse.



BEDIP-N

Quelle est la différence entre l'étude **BEDIP-N** et le suivi normal pendant la grossesse?

Votre traitement et le suivi ne diffère en rien de la pratique normale pendant la grossesse. Vous ne recevrez aucun médicament « test » lié à l'étude. Ce sont uniquement les seuils de glycémie (taux de sucre dans le sang) lors des tests de dépistage qui sont l'objet de l'étude.

On vous demandera de répondre à des questionnaires pendant les différentes visites et des prises de sang supplémentaires seront réalisées pour analyser votre métabolisme du sucre. Vous recevrez un test supplémentaire de dépistage pour le diabète gestationnel pendant 24-26 semaines de la grossesse qui est spécifique pour l'étude. Toutes les autres visites font partie du suivi de routine pendant la grossesse.



Ceci pourrait vous intéresser ?

Parlez-en à votre gynécologue ou votre sage-femme pour plus d'informations.

www.bedip.be