



Nationale
Loterij



UZ
LEUVEN



Kliniek Sint-Jan
Clinique Saint-Jean



VLAAMSE VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
partner voor vrouw & vrouwenarts

**U bent zwanger van een eenling?
U bent tussen 18 jaar en 45 jaar?
U bent minder dan 3 maanden zwanger?**

**Dan is deze studie rond opsporing
van diabetes en zwangerschapsdiabetes
voor u zeer interessant!**



BEDIP-N

Waar gaat de **BEDIP-N** studie over?

De BEDIP-N studie bestudeert een nieuwe manier om diabetes tijdens de zwangerschap op te sporen.

Jaarlijks worden in België bijna 135 000 vrouwen zwanger. Vijf tot tien percent van hen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met een te hoge bloedsuiker. Het is erg belangrijk om dit op tijd vast te stellen en te behandelen. Hoge bloedsuikers verhogen immers het risico op verwickelingen voor moeder en kind, zowel tijdens als na de zwangerschap. Daarom raadt men bij elke zwangere vrouw een opsporingstest aan. Hierbij wordt de bloedsuiker gemeten na het drinken van een suikeroplossing. Er is echter veel discussie over hoe deze test best geïnterpreteerd wordt, en welke afkapwaarden gehanteerd moeten worden.

In de BEDIP-N studie worden zowel een niet gekende voorafbestaande diabetes vroeg in de zwangerschap als een nieuw ontstane zwangerschapsdiabetes opgespoord. Hierbij worden nieuwe afkapwaarden geëvalueerd. Er worden gegevens verzameld over de opvolging voor de bevalling, de bevalling zelf en de gezondheid van de baby. Bij een verhoogde bloedsuiker worden ook gegevens verzameld over de opvolging en behandeling hiervan, en over de evolutie van de suikerwaarden na de bevalling.



BEDIP-N

Waar ligt het verschil tussen de **BEDIP-N** studie en de gewone opvolging van uw zwangerschap?

Uw behandeling en opvolging zullen niet verschillen van de normale aanpak bij een zwangerschap. U krijgt geen studiemedicatie toegediend. Enkel de gebruikte referentiewaarden van de suikerspiegels bij de opsporingstesten zijn specifiek voor de studie.

Er zal u gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen tijdens de verschillende bezoeken en er zullen extra bloedstalen afgenomen worden voor het analyseren van uw suikermetabolisme. U krijgt ook een extra opsporingstest voor zwangerschapsdiabetes tussen 24-26 weken die specifiek is voor de studie. Alle andere visites zijn standaard zoals voor alle zwangeren.



Heeft u interesse?

Spreek uw gynaecoloog of vroedvrouw aan voor meer informatie.

www.bedip.be